

頸神經或腰神經神經根鞘/周圍注射阻滯疼痛術

患者須知

簡介

- 神經根阻滯術用於診斷神經根炎症是否頸部或背部疼痛的原因和確定疼痛的源頭。
- 本手術也可用於治療與神經根疾病相關的疼痛。
- 本手術將由有介入治療和骨骼肌放射學專業技能的放射科醫生負責實施。
- 本術通常在放射科在 X 線透視和 CT 的監視指導下完成。

流程

- 手術進針部位通常會在脊椎旁後側區域。
- 在無菌的操作下，小孔徑針在圖像監視系統的指導下插入。
- 令患者產生相同疼痛的神經根會被找出。
- 注射局部麻醉劑到引起疼痛的神經部位。
- 本術亦可為外科手術治療提供幫助。
- 手術大約需要花時 30-45 分鐘。
- 術後無需特殊監護。
- 疼痛改善持續 8-12 周，可能需要重複注射治療。

可能發生的併發症

並不常見

- 血腫和出血。
- 感染。
- 脊髓動脈供血受損（罕見）。
- 非離子性碘造影劑引起的不良反應發生率低於 0.7%。非離子性造影劑引起的死亡率低於 1/250,000。

聲明

本患者須知單張由香港介入放射科醫學會編寫。本單張的主要作用是提供病人及家屬一般須知的資料，並未能全面包括這項介入手術的所有資料，亦並非向閣下提供任何建議或醫療意見。閣下不應依賴本單張的任何資料去作出任何決定或行動。香港介入放射科醫學會不會負責任何因利用這病人須知單張而引起之後果及法律責任。在編寫單張過程中，負責人員已盡量將最新及準確之資料包括在內。但隨着新的醫療研究結果公佈及技術發展，單張內的資料未必能反映最新情況。病人及家屬應向你們的主診醫生詢問有關這項介入手術的一切疑問。

2010 年編寫・版本 2.0